



Đôi khi bạn cần
có cơ hội thứ nhì.

Bạn có
72 tiếng đồng
hồ để hành
động.



Tại tiểu bang Washington, phụ nữ có thể tới thăm một số tiệm
thuốc tây để mua thuốc ECPs. Gói dùng giấy điền thuốc ECPs để
biết thêm chi tiết.

- Mô Web Site ECPs www.not-2-late.com
- Gọi điện thoại số 1-888-NOT-2-LATE (1-888-668-2528)
(kinh doanh sách những cửa hàng cung cấp thuốc ECPs
để xin danh sách những cửa hàng cung cấp thuốc ECPs
(kinh doanh phi, bằng tiếng Anh).

Muốn mua thuốc ECPs thì:



Mới Giao Hợp?

Sợ Thụ Thai?

THUỐC NGỪA THAI KHẨN CẤP

(Emergency Contraceptive Pills - ECPs)

Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp là gì?

- Thuốc ECPs là thuốc ngừa thai an toàn và công hiệu ngăn chặn sự thụ thai sau khi giao hợp.
- Bạn nên bắt đầu dùng thuốc ECPs nội trong 72 tiếng đồng hồ (3 ngày) sau khi giao hợp không dùng phuơng pháp ngừa thai và không muốn thụ thai.
- Sau khi giao hợp bạn nên dùng thuốc ECPs càng sớm càng có công hiệu.
- Thuốc ECPs không phải là thuốc phá thai. Nếu bạn đã có thai rồi thì thuốc này không có tác dụng gì hết.

Bạn nên dùng thuốc ECPs trong trường hợp nào?

Thuốc ECPs có thể dùng được nếu bạn có giao hợp không dùng bao cao su trong vòng 3 ngày qua.

Bạn nên dùng thuốc ECPs nếu:

- Bạn không dùng phuơng pháp ngừa thai nào khác.
- Bao cao su bị lủng.
- Bạn quên 2 viên hoặc trên 2 viên thuốc ngừa thai, hoặc bắt đầu dùng vỉ thuốc ngừa thai trễ.
- Màng vòng xoắn tuột.
- Bạn quên chích thuốc ngừa thai.
- Bạn bị cưỡng dâm.

Thuốc ECPs có tác dụng như thế nào?

Thuốc ECPs ngăn ngừa sự thụ thai bằng cách:

- Tạm thời ngăn chặn sự rụng trứng.
- Ngăn ngừa sự thụ tinh.
- Ngăn không cho trứng đã thụ tinh bám vào thành tử cung.

Thuốc ECPs không ngăn chặn được những bệnh truyền nhiễm qua tình dục, kể cả HIV/AIDS.

Một số phụ nữ có thể bị phản ứng nhức đầu, ói mửa.

Thuốc ECPs không có ảnh hưởng gì đến khả năng thụ thai trong tương lai.

Muốn biết thêm chi tiết về việc mua thuốc ECPs xin liên lạc điện thoại: 1-888-NOT-2-LATE.





Dear Colleague,

The Washington State Department of Health (DOH) is pleased to provide camera-ready art for printing this educational material. To ensure that the original quality of the piece is maintained, please read and follow the instructions below and the specifications included for professional printing.

- **Use the latest version.** DOH materials are developed using the most current information available, are checked for clinical accuracy, and are field tested with the intended audience to ensure they are clear and readable. DOH programs make periodic revisions to educational materials, so please check this web site to be sure you have the latest version. DOH assumes no responsibility for the use of this material or for any errors or omissions.
- **Do not alter.** We are providing this artwork with the understanding that it will be printed without alterations and copies will be free to the public. Do not edit the text or use illustrations or photographs for other purposes without first contacting us. Please do not alter or remove any logos, publication numbers or revision dates. If you want to use a part of this publication for other purposes, contact the Office of Health Promotion first.
- **For quality reproduction:** Low resolution PDF files are intended for black and white or color desktop printers. They work best if you are making only one or two copies. High resolution PDF files are intended for reproducing large quantities and are set up for use by professional offset print shops. The high resolution files also include detailed printing specifications. Please match them as closely as possible and insist on the best possible quality for all reproductions.

If you have questions, contact:
Office of Health Promotion
P.O. Box 47833 Olympia, WA 98504-7833
(360) 236-3736

Sincerely,
Health Education Resource Exchange Web Team